



FICHAS VARIETALES DE PIMIENTOS CARACTERIZADOS EN "LA ORDEN"



Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Juan Gragera Facundo
Carmen Guadalupe Gil Torralvo
José Miguel Cano Suárez
María Dolores Muñoz Atanasio

Instituto de Investigaciones Agrarias Finca “La Orden-Valdesequera”
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación
Gobierno de Extremadura

2014

Edita:

Instituto de Investigaciones Agrarias Finca “La Orden-Valdesequera”
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación
Gobierno de Extremadura
Autovía A-5, Km 372
06187 Guadajira (Badajoz)
Tel: 924014000
<http://cicytex.gobex.es>
e-mail: cicytex@gobex.es

Dep. Legal: BA-000391-2014

Coordinador y editor:

Juan Gragera Facundo

Autores:

Juan Gragera Facundo
Carmen Guadalupe Gil Torralvo
José Miguel Cano Suárez
María Dolores Muñoz Atanasio

Presentación

Por las mismas razones que exponíamos en el libro *Fichas varietales de tomates caracterizados en “La Orden”*, también accesible *on-line* en la dirección *web* de CICYTEX, hemos considerado la oportunidad y conveniencia de esta publicación, en la que presentamos el resultado de la mayor parte de los trabajos de caracterización de recursos fitogenéticos de pimiento, que hemos realizado en “La Orden” durante los últimos años. Se trata de un catálogo de fichas varietales, cada una de las cuales incluye la caracterización básica de una entrada de pimiento. La mayor parte de las fichas corresponden a cultivares locales, oriundos de diversas comarcas españolas, casi todas ellos conservados en el Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana, COMAV.

Queremos aprovechar también esta presentación para expresar nuestro agradecimiento a cuantas personas e instituciones han contribuido, con su trabajo o económicamente, a que hayamos podido realizar esta publicación:

A todo el personal de la finca “La Orden” que con su trabajo hay contribuido a recopilar los datos necesarios para elaborar esta publicación.

A los agricultores, aficionados a la horticultura y asociaciones, que nos han proporcionado semillas de cultivares locales.

Al Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana, COMAV, y al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, IMIDA, que suministraron semilla de la mayor parte de las entradas.

Al Instituto Nacional de Investigaciones agrarias, INIA que, junto con el Gobierno de Extremadura, ha financiado el desarrollo de los trabajos que han permitido obtener la información necesaria para poder elaborar este documento, a través de los proyectos INIA RTA2006-00144-C02-02, titulado “Selección de variedades tradicionales de hortalizas adaptadas al cultivo ecológico en Extremadura”, y RF2008-000011-C13-11, titulado “Multiplicación y caracterización de recursos fitogenéticos de hortícolas para su conservación en los bancos de germoplasma”.

Juan Gragera Facundo, agosto de 2014

ÍNDICE

Introducción.....	1
Material vegetal.....	3
Técnicas de cultivo.....	7
Contenido de las fichas.....	11
Obtención de semilla.....	15
Fichas varietales.....	17
'BGV000057'	18
'BGV000548'	19
'BGV000549'	20
'BGV000550'	21
'BGV000552'	22
'BGV000558'	23
'BGV000561'	24
'BGV000562'	25
'BGV000575'	26
'BGV000604'	27
'BGV000631'	28
'BGV000665'	29
'BGV000672'	30
'BGV000673'	31
'BGV000676'	32
'BGV000677'	33
'BGV001311'	34
'BGV001446'	35
'BGV001815'	36
'BGV001834'	37
'BGV001837'	38
'BGV001846'	39
'BGV001851'	40
'BGV001868'	41
'BGV002533'	42

Índice

'BGV002535'	43
'BGV002536'	44
'BGV002557'	45
'BGV002647'	46
'BGV002657'	47
'BGV003763'	48
'BGV003767'	49
'BGV004031'	50
'BGV004038'	51
'BGV004052'	52
'BGV004057'	53
'BGV004061'	54
'BGV004064'	55
'BGV004065'	56
'BGV004317/1'	57
'BGV004317/2'	58
'BGV004324'	59
'BGV004449'	60
'BGV004457'	61
'BGV004476'	62
'BGV005096'	63
'BGV005110'	64
'BGV005117'	65
'BGV005118'	66
'BGV005119'	67
'BGV005126'	68
'BGV005134'	69
'BGV005137'	70
'BGV008269'	71
'BGV008470'	72
'BGV010474'	73

Índice

'BGV010945'	74
'BGV011040'	75
'BGV011043'	76
'BGV011560'	77
'BGV011561'	78
'BGV011564'	79
'BGV011565'	80
'BGV011569'	81
'BGV011573'	82
'BGV011574'	83
'BGV011583'	84
'BGV013144'	85
'CA-6'	86
'CA-8'	87
'CA-12'	88
'CA-12-1'	89
'CA-23'	90
'Corera F1'	91
'Infante'	92
'JARANDA'	93
'JARIZA'	94
'JEROMÍN'	95
'MU-CA-3'	96
'MU-CA-7'	97
'MU-CA-8'	98
'MU-CA-10'	99
'MU-CA-17'	100
'MU-CA-18-1'	101
'MU-CA-22'	102
'P012009'	103
'P012012'	104

Índice

'P022009'	105
'P032009'	106
'PAS014702'	107
'Piquillo'	108
'Plaza Bullas'	109

Introducción

En la introducción de *Fichas varietales de tomates caracterizados en “La Orden”*, publicación *on-line* que comparte con esta autores y editorial, ya se describían la evolución histórica de la pérdida de diversidad genética de las especies cultivadas, las principales causas que la originaron y las acciones que organismos públicos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, han llevado a cabo durante las últimas décadas para preservar esta diversidad. Se indicaba también en dicha introducción la contribución del Departamento de Hortofruticultura del Instituto de Investigaciones Agrarias de la Finca “La Orden-Valdesquera” a la conservación recursos fitogenéticos de especies hortícolas, “colaborando desde principios de los 1990 con el COMAV en las tareas de caracterización y multiplicación de entradas de varias especies hortícolas de sus colecciones”. Dentro de estas especies se encuentra el pimiento, objeto de la presente publicación.

Los trabajos de caracterización de pimiento desarrollados han servido de base para la elaboración del presente documento, en el que se presentan las fichas de las entradas de esta especie estudiadas en “La Orden” entre 2007 y 2012. Antecedes a las fichas esta introducción, la relación del material vegetal estudiado, las técnicas de cultivo utilizadas para poderlo multiplicar y caracterizar, una breve explicación de los descriptores reflejados en las mismas y algún método de obtención de semilla no híbrida de pimiento, que permite mantener el grado de pureza inicial de los mismos.

El objetivo de esta publicación, como el de *Fichas varietales de tomates caracterizados en “La Orden”*, es el de dar a conocer a la sociedad en general, y al sector hortícola en particular, las variedades tradicionales, en este caso de pimiento, que los autores han caracterizado y multiplicado en “La Orden” en su contribución a los trabajos de catalogación y conservación de los recursos fitogenéticos de las colecciones activas nacionales. La importancia de dar a conocer públicamente estas variedades radica en la posibilidad real del uso de alguna de ellas, dada la titularidad pública de las mismas, en determinadas condiciones de cultivo como la horticultura *amateur*, huertos urbanos, agricultura ecológica, etc..

Material vegetal

Se presentan las fichas de 92 entradas de pimiento, procedentes casi todas del COMAV (Tabla 1). De ellas, 88 son cultivares locales españoles de distintas provincias, 1 es de procedencia desconocida y 3 son cultivares comerciales (Figura 1).

Tabla 1. Material vegetal caracterizado: Código, año de caracterización, entidad donante, origen y nombre local del mismo.

Código	Año	Donante	Origen: localidad, provincia o estado, país	Nombre local
BGV00057	2009	COMAV ¹	Quicena, Huesca, España	Pimiento morro de vaca
BGV000548	2011	COMAV ¹	Picena, Granada, España	Pimiento picante cornicabra
BGV000549	2011	COMAV ¹	Purullena, Granada, España	Pimiento dulce de matanza
BGV000550	2011	COMAV ¹	Purullena, Granada, España	Pimiento picante
BGV000552	2011	COMAV ¹	Guéjar de la Sierra, Granada, España	Pimiento picante corto
BGV000558	2011	COMAV ¹	Ronda, Málaga, España	Pimiento sin cascós
BGV000561	2011	COMAV ¹	Igualeja, Málaga, España	Pimiento cuatro cascós
BGV000562	2011	COMAV ¹	Cómpeta, Málaga, España	Pimiento
BGV000575	2011	COMAV ¹	Algeciras, Cádiz, España	Pimiento cuatro cascós
BGV000604	2007 y 2008	COMAV ¹	Alcalá la Real, Jaén, España	Pimiento morrón
BGV000631	2009	COMAV ¹	Guéjar de la Sierra, Granada, España	Pimiento picante largo
BGV000665	2011	COMAV ¹	Cortegana, Huelva, España	Pimiento colorado
BGV000672	2007	COMAV ¹	Cantoria, Almería, España	Pimiento italiano
BGV000673	2007	COMAV ¹	Laujar de Andarax, Almería, España	Pimiento italiano
BGV000676	2007	COMAV ¹	Laujar de Andarax, Almería, España	Pimiento piquillo
BGV000677	2007	COMAV ¹	Beires, Almería, España	Pimiento italiano
BGV001311	2010	COMAV ¹	Infesto, Asturias, España	Pimiento de Infesto
BGV001446	2009	COMAV ¹	Port de Sóller, Sóller, Baleares, España	Pebrera ornamental
BGV001815	2009	COMAV ¹	Miravet, Tarragona, España	Pimiento cuerno de toro
BGV001834	2009	COMAV ¹	Manresa, Barcelona, España	Pimiento cuatro morros
BGV001837	2009	COMAV ¹	Barcelona, Barcelona, España	Bitxo picant
BGV001846	2009	COMAV ¹	Castellbisbal, Barcelona, España	Pebrot d'escalivar
BGV001851	2007	COMAV ¹	Maresme, Barcelona, España	Pimiento de Reus "Gros tres caires"
BGV001868	2007	COMAV ¹	Bages, Barcelona, España	Pebrot llarg
BGV002533	2010	COMAV ¹	Tinajo, Las Palmas, España	desconocido
BGV002535	2010	COMAV ¹	El Rosario, Sta. Cruz de Tenerife, España	desconocido
BGV002536	2010	COMAV ¹	La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife, España	Pimienta palmera
BGV002557	2010	COMAV ¹	El Granel, Puntallana, Sta. Cruz de Tenerife, España	Pimiento
BGV002647	2008	COMAV ¹	Vallehermoso, Sta. Cruz de Tenerife, España	Pimienta para secar
BGV002657	2009	COMAV ¹	Gomera, Sta. Cruz de Tenerife, España	desconocido
BGV003763	2008 y 2009	COMAV ¹	Molinos de Papel, Palomera, Cuenca, España	Pimiento morrón
BGV003767	2008	COMAV ¹	Azután, Toledo, España	Pimiento verato
BGV004031	2007	COMAV ¹	Hervás, Cáceres, España	Pimiento bola de relleno
BGV004038	2009	COMAV ¹	Hoyos, Cáceres, España	Pimiento largo dulce
BGV004052	2008	COMAV ¹	Garganta de la Olla, Cáceres, España	Pimiento largo sequero
BGV004057	2008	COMAV ¹	Badajoz, Badajoz, España	Pimiento grueso
BGV004061	2009	COMAV ¹	Talavera la Real, Badajoz, España	Bola
BGV004064	2008	COMAV ¹	Mérida, Badajoz, España	Pimiento de colgar
BGV004065	2008	COMAV ¹	Santa Amalia, Badajoz, España	Pimiento morrón grueso
BGV004317/1	2010	COMAV ¹	Torre Pacheco, Murcia, España	Pimiento negral
BGV004317/2	2010	COMAV ¹	Torre Pacheco, Murcia, España	Pimiento negral
BGV004324	2010	COMAV ¹	Los Martínez del Puerto, Murcia, Murcia, España	Pimiento corneta
BGV004449	2007	COMAV ¹	Pamplona, Navarra, España	Pimiento del piquillo
BGV004457	2007	COMAV ¹	Bilbao, Vizcaya, España	Guindilla
BGV004476	2008 y 2009	COMAV ¹	Zorraquín, La Rioja, España	Pimiento cornicabra
BGV005096	2007	COMAV ¹	La Giraba, Luchente, Castellón, España	Guindilla
BGV005110	2009	COMAV ¹	Pilar de la Horadada, Alicante, España	Pimiento valenciano de Almusafes
BGV005117	2007	COMAV ¹	Rojales, Alicante, España	Bola
BGV005118	2007	COMAV ¹	San Fulgencio, Alicante, España	Pimiento americano
BGV005119	2007	COMAV ¹	San Fulgencio, Alicante, España	Bola tinta
BGV005126	2007, 2008 y 2009	COMAV ¹	Muchamiel, Alicante, España	Pimiento valenciano
BGV005134	2007	COMAV ¹	Alberique, Valencia, España	Pimiento cuatro cantos
BGV005137	2007 y 2008	COMAV ¹	Valencia, Valencia, España	Pimiento del piquillo
BGV008269	2010	COMAV ¹	desconocido	desconocido
BGV008470	2008	COMAV ¹	Bolbaite, Valencia, España	Pimiento del cuerno de Navarres

Tabla 1. Continuación.

Código	Año	Donante	Origen: localidad, provincia o estado, país	Nombre local
`BGV010474`	2007 y 2008	COMAV ¹	Oartzun, Guipúzcoa, España	Guindilla para vinagreta
`BGV010945`	2008	COMAV ¹	Vioño, Gozón, Asturias, España	Pimiento de casa
`BGV011040`	2008 y 2009	COMAV ¹	Ricla, Zaragoza, España	Pimiento cristalino
`BGV011043`	2010	COMAV ¹	Boquiñeni, Zaragoza, España	Pimiento morrón de plaza
`BGV011560`	2010	COMAV ¹	Jaraíz de la Vera, Cáceres, España	Pimiento largo fino
`BGV011561`	2010	COMAV ¹	Jaraíz de la Vera, Cáceres, España	Pimiento de bola redondo
`BGV011564`	2010	COMAV ¹	Casar de Palomero, Cáceres, España	Pimiento rojo grueso
`BGV011565`	2010	COMAV ¹	Casar de Palomero, Cáceres, España	Pimiento rojo grueso
`BGV011569`	2010	COMAV ¹	Villanueva de la Vera, Cáceres, España	Pimiento cornicabreño
`BGV011573`	2010	COMAV ¹	Abadía, Cáceres, España	Cornicabra grande
`BGV011574`	2010	COMAV ¹	Jaraíz de la Vera, Cáceres, España	Pimiento de bola alargado
`BGV011583`	2010	COMAV ¹	Mas de las Matas, Teruel, España	Pimiento de asar
`BGV013144`	2008	COMAV ¹	Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, España	Pimienta
`CA-6`	2007	IMIDA ²	Región de Murcia, España	desconocido
`CA-8`	2007	IMIDA ²	Bullas, Murcia, España	Pimiento cuerno
`CA-12`	2007	IMIDA ²	Región de Murcia, España	Morrón conserva
`CA-12-1`	2009	IMIDA ²	Zaén de Arriba, Murcia, España	Morrón de conserva
`CA-23`	2007	IMIDA ²	Región de Murcia, España	desconocido
`Corera FI`	2007	Ramiro Arnedo	comercial	Pimiento morrón
`Infante`	2007	Ramiro Arnedo	comercial	Pimiento lamuyo
`Jaranda`	2007 y 2008	Ramiro Arnedo (La Orden ³)	comercial (Selección de pimientos de la Vera)	Guinda para pimentón dulce
`Jariza`	2007	Jad Ibérica (La Orden ³)	comercial (Selección de pimientos de la Vera)	Guinda para pimentón dulce
`Jeromín`	2007 y 2008	La Orden ³	Selección de pimientos de la Vera, Cáceres, España	Guinda para pimentón picante
`MU-CA-3`	2007	IMIDA ²	San Javier, Murcia, España	Pimiento gallego
`MU-CA-7`	2008 y 2009	IMIDA ²	Torre Pacheco, Murcia, España	Trompa de vaca
`MU-CA-8`	2008	IMIDA ²	Torre Pacheco, Murcia, España	Pimiento morro de vaca
`MU-CA-10`	2008	IMIDA ²	Región de Murcia, España	desconocido
`MU-CA-17`	2007	IMIDA ²	Beniaján, Murcia, Murcia, España	Pimiento largo
`MU-CA-18-1`	2009	IMIDA ²	Región de Murcia, España	desconocido
`MU-CA-22`	2008	IMIDA ²	Los Pavos, Alhama de Murcia, Murcia, España	Pimiento morrón de conserva
`P012009`	2009	La Orden ³	Olivenza, Badajoz, España	Pimiento grande de Olivenza
`P012012`	2012	La Orden ³	Isla Gomera, Sta. Cruz de Tenerife, España	desconocido
`P022009`	2009	La Orden ³	Aldeanueva de la Vera, Cáceres, España	Pimiento largo verato
`P032009`	2009	La Orden ³	Aldeanueva de la Vera, Cáceres, España	Pimiento grueso verato
`PAS014702`	2010	COMAV ¹	Valle del Jerte, Cáceres, España	desconocido
`Piquillo`	2007	Ramiro Arnedo	comercial	Pimiento del piquillo
`Plaza Bullas`	2008	IMIDA ²	Bullas, Murcia, España	Pimiento de plaza

¹COMAV: Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.

²IMIDA: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. La Alberca (Murcia).

³La Orden : Centro de Investigación La Orden-Valdesequera. Guadajira (Badajoz).




Figura 1. Lugares de origen de las variedades de pimiento estudiadas.

Técnicas de cultivo

Siempre se aplicaron técnicas de cultivo acordes con la normativa vigente sobre agricultura ecológica.

A mediados o finales de marzo de cada año se preparaba el semillero en bandejas de poliuretano expandido con alvéolos troncocónicos de 2,5 x 2,5 x 5 cm, rellenos de un sustrato a base de turba sin fertilizar (70% negra y 30% rubia) y estiércol hecho de oveja en proporción 4:1. Las bandejas sembradas se pregerminaban en cámara a 27 °C, con un nivel de humedad relativa mayor del 70% en todo momento, durante 4 ó 5 días. Posteriormente se trasladaban a un invernadero de polietileno sin control de temperatura, donde permanecían hasta su transplante, que tenía lugar de 50 a 70 días más tarde (Foto 1).



Foto 1. Bandejas con plántulas de pimiento dentro del invernadero. El nivel de desarrollo que presentan las que aparecen en primer término es el óptimo para el transplante.

Simultáneamente al desarrollo del semillero, en una parcela de la finca “La Orden” (delimitada por las coordenadas, X: 702220,45 m y X: 702318,44 m; e Y: 4303534,81 m e Y: 4303455,66 m, huso 29, *datum* WGS84) inscrita en el organismo de control de agricultura ecológica de la Junta de Extremadura, se realizaban las labores preparatorias del terreno. En primer lugar se procedía a enterrar el cultivo anterior (triticale, o triticale con veza según el año) o su rastrojo (cuando éste se aprovechaba para forraje) con un pase de vertedera (Foto 2). Posteriormente se distribuía sobre la parcela estiércol hecho de oveja y se incorporaba al terreno mediante varios pases de grada. Suponiendo una mineralización del 50% el primer año, con el

estercolado se aportaban aproximadamente 40, 40 y 30 U.F. x ha⁻¹ de N, P₂O₅ y K₂O respectivamente. Seguidamente se conformaba la parcela en camas de 1 m de ancho, separadas entre sí 0,5 m mediante un surco.



Foto 2. Parcela con las pimenteras recién transplantadas. Obsérvese la materia orgánica, restos vegetales de triticale, incorporada al suelo.

El transplante en el campo se realizaba una vez montada la instalación de riego por goteo para poder aplicar un ligero riego previo. Las plántulas se transplantaban en el centro de las camas y se disponían en dos filas paralelas separadas entre sí 0,30 m, con una separación entre plantas dentro de cada fila de 0,25 m (Foto 2).

La parcela se regaba cubriendo en todo momento las necesidades reales del cultivo, aplicando mediante fertirrigación el abonado de cobertera a base de purines de oveja, aportando aproximadamente 90 U.F. de N y 50 U.F. de K₂O por hectárea.

El control de plagas y enfermedades en pimiento en condiciones de cultivo ecológico no resultó especialmente complejo, requiriéndose menor número de tratamientos que en otras especies hortícolas como, por ejemplo, el tomate. El control fitosanitario empezaba en el semillero con un tratamiento preventivo de cobre, para *Alternaria* spp. y *Pseudomonas*. Durante el desarrollo de los cultivos se realizaron varios tratamientos fitosanitarios. Para evitar ataques de oidio, mildiu y araña roja, se realizaban tratamientos preventivos durante los periodos en los que las condiciones eran adecuadas para los patógenos. También se trataba con una periodicidad de entre 7 y 10 días con *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstakii* (Berliner), desde el momento en que se observaban los primeros daños de *Heliothis*, *Helicoverpa armigera* (Hübner). Las pocas veces

que se detectaron pulgones se realizaron tratamientos a base de jabón potásico. Las malas hierbas se eliminaban por medios manuales y fue necesario escardar entre dos y cuatro veces según los años (Foto 3).



Foto 3. Pimienteras recién escardadas. Obsérvese la hierba eliminada.

Los frutos maduros se recolectaban manualmente en varias pasadas, según iban madurando (Foto 4), entre finales de julio y mediados de octubre.



Foto 4. Pimienteras con frutos maduros.

Contenido de las fichas.

Las fichas incluyen, además de imágenes del fruto maduro, el listado de los datos básicos de pasaporte, una selección de caracteres que se tomaron durante el cultivo o en la recolección (Tabla 2) y algunas observaciones consideradas de interés. Algunas fichas aparecen incompletas debido a errores en la toma de datos o en los ficheros informáticos. Estas fichas se han mantenido en la publicación porque a pesar de todo aportan mucha información inédita hasta hoy.

Los datos de pasaporte incluidos son nombre específico, clave oficial, lugar de colecta y nombre local.

Los caracteres se eligieron de entre los más representativos de los evaluados en los trabajos de caracterización. La selección de los mismos se realizó a partir de un análisis de datos global que incluía análisis de varianza, análisis de regresión y análisis de componentes principales.

Tabla 2. Caracteres que incluyen las fichas varietales. Categorías posibles o unidad de medida de los mismos.

Caracteres en la ficha:	Categorías posibles o unidad en que se mide:
Caracteres de planta:	
Altura de la planta	baja (<25 cm), media-baja (25-45 cm), media(46-65 cm), media-alta (66-85 cm), alta (>85)
Longitud del tallo	centímetros (cm): media \pm desv. típica
Caracteres de flor:	
Margen del cáliz	entero, intermedio, dentado, otro (ver fig. 2)
Constricción anular del cáliz	ausente, presente (ver fig. 2)
Caracteres de fruto:	
Días a la fructificación	número
Forma del fruto	elongado, casi redondo, triangular, acampanulado, acamplulado y en bloque, otro) (ver fig. 9)
Longitud del fruto	centímetros (cm): media \pm desv. típica
Peso del fruto	gramos (g): media \pm desv. típica
Espesor de la pared del fruto	milímetros (mm): media \pm desv. típica
Forma del fruto en la unión con el pedicelo	agudo, obtuso, truncado, cordado, lobulado (ver fig. 10)
Forma del ápice del fruto	puntudo, romo, hundido, hundido y puntudo, otro (ver fig. 10)
Apendice en el fruto, vestigio de la floración	ausente, presente (ver fig. 10)
Arrugamiento transversal del fruto	levemente corrugado, intermedio, muy corrugado (ver fig. 10)
Longitud de la placenta	<1/4 longitud del fruto, 1/4-1/2 longitud del fruto, >1/2 longitud del fruto
Sabor picante	ausente, presente (muy ligero, ligero, moderado, fuerte, muy fuerte)

Todos los caracteres, excepto el de sabor picante, se evaluaron en diez plantas, de acuerdo con los descriptores de pimiento del *International Plant Genetic Resources Institute* (IPGRI) publicado en 1995 y actualmente disponible *on-line*. Los caracteres de planta y de flor se registraron en campo, cuando los frutos del segundo y tercer racimo ya estaban bien desarrollados. Los caracteres de fruto se evaluaron en frutos maduros del segundo o tercer piso floral, durante la primera pasada de recolección. En las Figuras 2 y 3 se ilustra el procedimiento para la evaluación de algunos de los caracteres incluidos en las fichas. El carácter de planta denominado “Longitud del tallo” se presenta en algunos casos sin desviación típica. En estos casos se presenta el dato medido en una única planta representativa de la variedad.




Figura 2.- Descripción gráfica de las categorías de algunos de los descriptores evaluados (IPGRI, 1995).

El sabor picante se evaluó de forma subjetiva, probando la zona de la placenta más próxima al cáliz de un número variable de frutos. Si el sabor picante alcanzó la categoría de fuerte o muy fuerte, la evaluación se realizó sobre tres o cuatro frutos. Con estos grados de picor, probar más de un pimiento o dos por evaluador resulta casi imposible.

En cuanto a las observaciones, es preciso indicar que las variedades cuyas fichas no tienen observaciones pueden presentar aspectos agronómicos o cualitativos tan interesantes o más que las restantes. La diferencia entre unas y otras está en que, en las primeras, los evaluadores no anotaron observaciones por falta de tiempo durante el proceso de evaluación.




Figura 3.- Descripción gráfica de la categoría “Forma del fruto” (IPGRI, 1995).

Obtención de semilla

En la publicación previa titulada *Fichas varietales de tomates caracterizados en “La Orden”*, no se hizo referencia al modo de producir semilla. Dada la condición natural de especie autógena (son especies autógenas las que producen semillas a partir de la autopolinización de sus flores) del tomate, no es necesario guardar ninguna precaución especial para multiplicar variedades no híbridas de esta especie. En este caso el procedimiento de obtención de semilla consiste simplemente en extraer la semilla de frutos maduros y sanos. La única consideración a tener en cuenta en la obtención de semillas de tomate, si éstas se quieren conseguir bien limpias y exentas de la capa mucilaginosa que las envuelve, es que deben mantenerse, durante dos o tres días, en jugo de tomate a temperatura ambiente antes de lavarse y secarse. La fermentación del jugo de tomate elimina el mucílago externo. Posteriormente se lavan con agua y, tras secarse al aire sobre papel o tela, quedan listas para ser conservadas hasta su siembra en campañas posteriores.

El pimiento no es una especie autógena. Presenta naturalmente un nivel significativo de alogamia, variable en función del ambiente en que se cultive. Son especies alógamas las que producen semillas a partir de la polinización de las flores con polen procedente de otras flores, que pueden ser del mismo individuo o de otros individuos de la misma especie. Por esta razón, para obtener semilla de variedades no híbridas es necesario aislar las plantas que se van a destinar a la obtención de semilla.

Este aislamiento se puede conseguir mediante una barrera física que impida el acceso de insectos polinizadores (Foto 5), o mediante el cultivo de las plantas de las distintas variedades de las que se pretende obtener semilla lo suficientemente separadas entre sí y de otras plantas de pimiento, con el fin de impedir, o reducir hasta niveles muy bajos, las posibilidades de polinización cruzada entre variedades.



Foto 5.- Plantas de pimiento aisladas con sacos de agril apoyados sobre una simple estructura formada con cuatro cañas clavadas en el suelo.

Para obtener la semilla de las entradas cuyas fichas se recogen en esta publicación, destinada a su conservación en los bancos de germoplasma oficiales, se ha optado casi siempre por el

aislamiento de plantas con una barrera física. En plena floración, de cada variedad se elegían diez plantas sanas, a las que se les retiraban todos los frutos cuajados y las flores abiertas que presentaban. Inmediatamente después se cubría cada planta con un saco de agril amplio (Foto 5), manteniéndose así hasta el momento de la recolección. En ese momento se retiraban los sacos y se recogían los frutos, portadores de semilla de la autofecundación.

Otro método de obtener semilla de variedades no híbridas de pimiento, que no implica ningún trabajo especial, consiste en cultivar las plantas de pimiento destinadas a multiplicación a una distancia suficiente de otros cultivos de pimiento de otras variedades, de tal modo que las posibilidades de polinización cruzada entre variedades sea insignificante. En el caso del pimiento, cuyas flores no son especialmente atractivas para las especies de insectos polinizadores, las distancias mínimas entre variedades diferentes para garantizar esto son pequeñas (varias decenas de metros).

La extracción y limpieza de la semilla de pimiento es sencilla. Se separan del fruto, preferiblemente total o parcialmente desecado, se lavan con agua sobre una tela mosquitera (para pequeñas cantidades un colador grande es suficiente) y se secan sobre papel o tela, quedando listas para ser conservadas hasta su siembra en campañas posteriores.

Fichas varietales

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000057' (COMAV)

Lugar de colecta:

Quicena (Huesca, ESP)

Nombre local:

Pimiento morro de vaca

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque o en bloque

Longitud del fruto:

12,4±1,3 centímetros

Peso del fruto:

199,9±53,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,5±0,5 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado o lobulado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud el fruto

Sabor picante:

Sin evaluar

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000548` (COMAV)

Lugar de colecta:

Picena (Granada, ESP)

Nombre local:

Pimiento picante cornicabra

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

12,1±2,1 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

12,4±1,7 centímetros

Peso del fruto:

24,5±3,4 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,0±0,4 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado o intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente

Observaciones::

Pimiento tipo guinda.

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000549` (COMAV)

Lugar de colecta:

Purullena (Granada, ESP)

Nombre local:

Pimiento dulce manzana

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

19,5±0,7 centímetros

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

O triangular o acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

10,1±1,4 centímetros

Peso del fruto:

56,3±15,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,9±0,6 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado o truncado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

La forma del fruto está entre la de un piquillo y un lamuyo.

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV000550' (COMAV)

Lugar de colecta:

Purullena (Granada, ESP)

Nombre local:

Pimiento picante

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

12,0±2,9 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

119,7±24,5 centímetros

Peso del fruto:

18,1±2,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,6±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente

Observaciones::

Pimiento tipo guinda

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000552` (COMAV)

Lugar de colecta:

Guéjar de la Sierra (Granada, ESP)

Nombre local:

Pimiento picante corto

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

11 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

6,8±0,7 centímetros

Peso del fruto:

12,2±2,1 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,6±0,4 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000558` (COMAV)

Lugar de colecta:

Ronda (Málaga, ESP)

Nombre local:

Pimiento sin cascós

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

10 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

11,1±1,0 centímetros

Peso del fruto:

41,8±11,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,2±0,5 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Cordado o truncado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000561' (COMAV)

Lugar de colecta:

Igualeja (Málaga, ESP)

Nombre local:

Pimiento cuatro cascos

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

7,0 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

8,1±1,1 centímetros

Peso del fruto:

58,8±12,8 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,3±0,7 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado o intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV000562' (COMAV)

Lugar de colecta:

Cómpeta (Málaga, ESP)

Nombre local:

Pimiento

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

7,0 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

12,1±1,6 centímetros

Peso del fruto:

83,5±20,4 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,5±0,9 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000575` (COMAV)

Lugar de colecta:

Algeciras (Cádiz, ESP)

Nombre local:

Pimiento cuatro cascos

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

7 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

11,0±0,9 centímetros

Peso del fruto:

146,8±35,3 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,2±0,6 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido o hundido y apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente o presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000604` (COMAV)

Lugar de colecta:

Alcalá la Real (Jaén, ESP)

Nombre local:

Pimiento morrón

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

27,2±1,5 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

107 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:


6,7±0,6 centímetros

Peso del fruto:

126,9±13,1 gramos

Espesor de la pared del fruto:

6,3±0,8 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo morrón, muy productivo, muy buena calidad gustativa

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000631` (COMAV)

Lugar de colecta:

Guéjar de la Sierra (Granada, ESP)

Nombre local:

Pimiento picante largo

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Dentada

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Traiangular

Longitud del fruto:

12,5 ±1,3 centímetros

Peso del fruto:

32,9±10,5 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,7±0,3 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, moderado

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000665` (COMAV)

Lugar de colecta:

Cortegana (Huelva, ESP)

Nombre local:

Pimiento colorado

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

7 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:


100,0±8,6 centímetros

Peso del fruto:

56,7±5,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,6±1,0 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 o <1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000672' (COMAV)

Lugar de colecta:

Cantoria (Almería, ESP)

Nombre local:

Pimiento italiano

Altura de la planta:

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

23,2±2,3 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

105 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

12,0±1,0 centímetros

Peso del fruto:

74,3±9,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,9±0,3 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado o lobulado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones:

Fruto con aspecto de pimiento del piquillo grande

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV000673' (COMAV)

Lugar de colecta:

Laujar de Andarax (Almería, ESP)

Nombre local:

Pimiento italiano

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

23,2±0,8 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

104 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

19,7±1,3 centímetros

Peso del fruto:

85,9±18,8 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,3±0,5 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado o cordado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo italiano, buena calidad gustativa

...Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000676` (COMAV)

Lugar de colecta:

Laujar de Andarax (Almería, ESP)

Nombre local:

Pimiento del piquillo

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

25,2±4,4 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

105 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

9,8±1,1 centímetros

Peso del fruto:

41,9±4,8 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,3±0,6 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado o cordado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

No corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo piquillo

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV000677` (COMAV)

Lugar de colecta:

Beires (Almería, ESP)

Nombre local:

Pimiento italiano

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

21,8±1,9 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

104 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

17,2±1,4 centímetros

Peso del fruto:

50,3±9,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,6±0,5 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado o truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo italiano

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV001311` (COMAV)

Lugar de colecta:

Infiesto (Asturias, ESP)

Nombre local:

Pimiento de Infiesto

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

13,1±3,5 centímetros

Peso del fruto:

125,8±56,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,7±0,6 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV001446` (COMAV)

Lugar de colecta:

Port de Sóller. Sóller (Mallorca, ESP)

Nombre local:

Pebrera ornamental

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

22,6±1,4 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

6,0±1,1 centímetros

Peso del fruto:

1,4±0,1 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,1±0,1 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Agudo

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo guindilla sin sabor picante

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV001815` (COMAV)

Lugar de colecta:

Miravet (Tarragona, ESP)

Nombre local:

Pimiento cuerno de toro

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

17,0±2,9 centímetros

Peso del fruto:

187,4±25,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,4±0,6 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado o lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio o muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV001834' (COMAV)

Lugar de colecta:

Manresa (Barcelona, ESP)

Nombre local:

Pimiento cuatro morros

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

21,1±2,9 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

14,8±1,4 centímetros

Peso del fruto:

205,1±13,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,3±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Cordado o lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/2-1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV001837' (COMAV)

Lugar de colecta:

Barcelona (Barcelona, ESP)

Nombre local:

Bitxo picant

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

18,8±1,7 centímetros

Peso del fruto:

30,1±6,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,7±0,2 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Picante, muy fuerte

Observaciones::

Pimiento tipo guindilla

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV001846` (COMAV)

Lugar de colecta:

Castellbisbal (Barcelona, ESP)

Nombre local:

Pebrot d'escalivar

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

20,6±2,1 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:


16,7±1,8 centímetros

Peso del fruto:

244,7±79,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,8±0,7 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado o cordado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio o muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV001851` (COMAV)

Lugar de colecta:

Maresme (Barcelona, ESP)

Nombre local:

Pimiento de Reus "Gros tres caires"

Altura de la planta:

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

24,4±0,9 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

24,1±1,7 centímetros

Peso del fruto:

192,3±31,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

Sin evaluar

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones:

Pimiento tipo lamuyo

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV001868` (COMAV)

Lugar de colecta:

Bages (Barcelona, ESP)

Nombre local:

Pebrot llarg

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

27±1,9 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:


14,1±1,3 centímetros

Peso del fruto:

117,1±24,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,6±1,1 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado, cordado o Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado o Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del tallo

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo lamuyo

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV002533` (COMAV)

Lugar de colecta:

Tinajo (Las Palmas, ESP)

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

99 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

11,0±1,1 centímetros

Peso del fruto:

31,3±3,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,4±0,2 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, fuerte

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV002535` (COMAV)

Lugar de colecta:

El Rosario (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

7,2±0,6 centímetros

Peso del fruto:

13,8±2,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,5±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, fuerte

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV002536` (COMAV)

Lugar de colecta:

La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)

Nombre local:

Pimienta palmera

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

8,4±0,7 centímetros

Peso del fruto:

23,6±2,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,7±0,1 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado, truncado o lobulado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente o presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV002557' (COMAV)

Lugar de colecta:

El Granel. Puntallana (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)

Nombre local:

Pimiento

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Elongado o triangular

Longitud del fruto:

12,0±1,3 centímetros

Peso del fruto:

42,9±7,8 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,7±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Intermedio

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente o ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV002647' (COMAV)

Lugar de colecta:

Vallehermoso (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)

Nombre local:

Pimienta para secar

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

19,5±1.3 centímetros

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

125 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

8,8±0,6 centímetros

Peso del fruto:

40,9±6,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,8±0,4 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado o cordado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1,4 o 1/4 -1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, moderado

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV002657` (COMAV)

Lugar de colecta:

Isla Gomera (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

7,6±4,4 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

6,5±0,6 centímetros

Peso del fruto:

5,0±1,1 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,6±0,2 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Agudo

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, muy fuerte

Observaciones::

Pimiento tipo guindilla de cayena

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV003763` (COMAV)

Lugar de colecta:

Molinos de Papel. Palomera (Cuenca, ESP)

Nombre local:

Pimiento morrón

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

12 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

139 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

10,2±1,3 centímetros

Peso del fruto:

34,4±13,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,8±0,3 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado o truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo morrón

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV003767` (COMAV)

Lugar de colecta:

Azután (Toledo, ESP)

Nombre local:

Pimiento verato

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

16 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

139 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

23,3±1,4 centímetros

Peso del fruto:

33,1±6,5 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,8±0,1 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Sin evaluar

Observaciones::

Pimiento tipo guinda

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004031` (COMAV)

Lugar de colecta:

Hervás (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento bola de relleno

Altura de la planta:

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

21,8±3,3 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Casi redondo o acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

6,9±0,5 centímetros

Peso del fruto:

123,5±24,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

6,3±0,4 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones:

Se observan plantas con dos formas de fruto diferentes

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004038` (COMAV)

Lugar de colecta:

Hoyos (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento largo dulce

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

13,6±5,7 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

17,2±0,8 centímetros

Peso del fruto:

42,5±7,1 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,5±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo guinda

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004052` (COMAV)

Lugar de colecta:

Garganta la Olla (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento largo sequero

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

19,7±1,5 centímetros

Margen del cáliz:

Dentadito

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

139 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

17,4±1,9 centímetros

Peso del fruto:

17,1±1,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,2±0,3 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo guinda

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV004057' (COMAV)

Lugar de colecta:

Badajoz (Badajoz, ESP)

Nombre local:

Pimiento grueso

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

21,9±2,1 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

84 días

Forma del fruto:

Triangular o acmpanulado y en bloque

Longitud del fruto:

15,3±2,0 centímetros

Peso del fruto:

97,2±25,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,8±0,6 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido o hundido y apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, muy ligero

Observaciones::

Se observan dos tipos de fruto. Los triangulares son más pequeños y deformes.

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004061` (COMAV)

Lugar de colecta:

Talavera la Real (Badajoz, ESP)

Nombre local:

Bola

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

15,5±1,8 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Casi redondo

Longitud del fruto:

3,6±0,2 centímetros

Peso del fruto:

33,4±2,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,0±0,2 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo bola

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004064` (COMAV)

Lugar de colecta:

Mérida (Badajoz, ESP)

Nombre local:

Pimiento de colgar

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

18 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

110 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:


18,5±1,3 centímetros

Peso del fruto:

25,1±5,4 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,6±0,2 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente . muy ligero

Observaciones::

Pimiento tipo guinda

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004065` (COMAV)

Lugar de colecta:

Santa Amalia (Badajoz, ESP)

Nombre local:

Pimiento morrón grueso

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

15,6±1,3 centímetros

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

125 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

14,4±1,0 centímetros

Peso del fruto:

186,3±29,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,3±0,8 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Sin evaluar

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV004317/1' (COMAV)

Lugar de colecta:

Torre Pacheco (Murcia, ESP)

Nombre local:

Pimiento negral

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

99 días

Forma del fruto:

Casi redondo

Longitud del fruto:

5,1±0,2 centímetros

Peso del fruto:

22,7±2,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,6±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente o ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, moderado

Observaciones::

Pimiento tipo bola

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004317/2' (COMAV)

Lugar de colecta:

Torre Pacheco (Murcia, ESP)

Nombre local:

Pimiento negral

Altura de la planta::

Media (46-65) centímetros

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

99 días

Forma del fruto:

Casi redondo

Longitud del fruto:

4,8±0,3 centímetros

Peso del fruto:

24,0±2,3 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,6±0,2 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo bola

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV004324' (COMAV)

Lugar de colecta:

Los Martínez del Puerto. Murcia (Murcia, ESP)

Nombre local:

Pimiento corneta

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

13,3±0,5 centímetros

Peso del fruto:

39,3±2,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,2±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo guindilla grande

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004449` (COMAV)

Lugar de colecta:

Pamplona (Navarra, ESP)

Nombre local:

Pimiento del piquillo

Altura de la planta:

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

18,0±1,9 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

105 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

9,9±0,6 centímetros

Peso del fruto:

39,0±3,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,3±0,5 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones:

Pimiento tipo piquillo

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004457` (COMAV)

Lugar de colecta:

Bilbao (Vizcaya, ESP)

Nombre local:

Guindilla

Altura de la planta::

Sin evaluar

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

107 días

Forma del fruto:

Elongada o triangular

Longitud del fruto:

14,9±1,4 centímetros

Peso del fruto:

22,4±4,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,1±0,3 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Presente

Observaciones::

Se observan dos tipos de fruto diferentes

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV004476` (COMAV)

Lugar de colecta:

Zorraquín (La Rioja, ESP)

Nombre local:

Pimiento cornicabra

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

19 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

136 días

Forma del fruto:

Elongado o triangular

Longitud del fruto:

19,2±2,4 centímetros

Peso del fruto:

39,2±8,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,9±0,5 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Buena calidad para freír

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV005096` (COMAV)

Lugar de colecta:

La Giraba. Ludiente (Castellón, ESP)

Nombre local:

Guindilla

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

22,7±5,8 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

105 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

10,1±1,5 centímetros

Peso del fruto:

19,5±5,3 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,7±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, fuerte

Observaciones::

Pimiento tipo guindilla

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV005110` (COMAV)

Lugar de colecta:

Pilar de la Horadada (Alicante, ESP)

Nombre local:

Pimiento valenciano de Almusafes

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

24,1±2,9 centímetros

Margen del cáliz:

Dentada

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

14,8±1,7 centímetros

Peso del fruto:

193,6±63,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,6±1,2 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado, cordado o truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo o hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV005117` (COMAV)

Lugar de colecta:

Rojales (Alicante, ESP)

Nombre local:

Bola

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

27,2±1,9 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

106 días

Forma del fruto:

Casi redondo

Longitud del fruto:


3,3±0,2 centímetros

Peso del fruto:

31,9±5,1 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,3±0,5 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo bola

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV005118` (COMAV)

Lugar de colecta:

San Fulgencio (Alicante, ESP)

Nombre local:

Pimiento americano

Altura de la planta:

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

18,8±3,7 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

107 días

Forma del fruto:

Casi redondo

Longitud del fruto:

3,1±0,2 centímetros

Peso del fruto:

33,1±4,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,5±0,7 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones:

Pimiento tipo bola

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV005119' (COMAV)

Lugar de colecta:

San Fulgencio (Alicante, ESP)

Nombre local:

Bola tinta

Altura de la planta::

Media alta (45-65 centímetros)

Longitud del tallo:

29,8±1,5 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

107 días

Forma del fruto:

Casi redondo

Longitud del fruto:

3,6±0,3 centímetros

Peso del fruto:

24,8±2,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,8±0,4 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo bola

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV005126` (COMAV)

Lugar de colecta:

Muchamiel (Alicante, ESP)

Nombre local:

Pimiento valenciano

Altura de la planta::

Media-alta (46-65) centímetros

Longitud del tallo:

22±1,5 centímetros

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

140 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

17,0±1,9 centímetros

Peso del fruto:

213,7±41 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,6±0,4 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado o lobulado

Forma del ápice del fruto:

Romo o hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4 - 1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo lamuyo, buena calidad

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV005134' (COMAV)

Lugar de colecta:

Alberique (Valencia, ESP)

Nombre local:

Pimiento cuatro cantos

Altura de la planta::

Media-baja (25-45 centímetros)

Longitud del tallo:

20,2±2,4 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

8,8±1,7 centímetros

Peso del fruto:

170,3±27,5 gramos

Espesor de la pared del fruto:

6,4±0,5 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo california, buena calidad

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV005137' (COMAV)

Lugar de colecta:

Valencia (Valencia, ESP)

Nombre local:

Pimiento del piquillo

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

26,2±3,6 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

105 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

9,0±1,1 centímetros

Peso del fruto:

37,3±3,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,8±0,3 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, muy ligero

Observaciones::

Pimiento tipo piquillo, muy productivo, muy buena calidad gustativa

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV008269` (COMAV)

Lugar de colecta:

Desconocido

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

8,3±0,4 centímetros

Peso del fruto:

9,2±1,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,3±0,1 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, moderado

Observaciones::

Pimiento tipo guindilla pequeña

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV008470` (COMAV)

Lugar de colecta:

Bolbaite (Valencia, ESP)

Nombre local:

Pimiento del cuerno de Navarrés

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

18,5±2,3 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

84 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

18,4±2,2 centímetros

Peso del fruto:

90,6±20,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,8±0,6 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado u obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento grande de forma cónica

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV010474' (COMAV)

Lugar de colecta:

Oiartzun (Guipúzcoa, ESP)

Nombre local:

Guindilla para vinagreta

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

13,8±1,6 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

105 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

13,8±1,3 centímetros

Peso del fruto:

9,5±2,3 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,0±0,2 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

No corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, fuerte

Observaciones::

Pimiento tipo guindilla, muy buena calidad gustativa en verde, con picor moderado

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV010945` (COMAV)

Lugar de colecta:

Vioño. Gozón (Asturias, ESP)

Nombre local:

Pimiento de casa

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

21,9±2,1 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

140 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:


8,7±1,4 centímetros

Peso del fruto:

145,0±27,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,3±0,6 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado, lobulado o truncado

Forma del ápice del fruto:

Hundido o hundido y apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente o ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Sin evaluar

Observaciones::

Pimiento tipo california

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV011040` (COMAV)

Lugar de colecta:

Ricla (Zaragoza, ESP)

Nombre local:

Pimiento cristalino

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

14,8±2,2 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

111 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:


18,4±1,8 centímetros

Peso del fruto:

107,1±20,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,1±0,5 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado o cordado

Forma del ápice del fruto:

Romo o hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Buena calidad para freír

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV011043` (COMAV)

Lugar de colecta:

Boquiñeni (Zaragoza, ESP)

Nombre local:

Pimiento morrón de plaza

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Triangular o acampanulado

Longitud del fruto:

10 centímetros

Peso del fruto:

212,5±18,4 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,3±0,5 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo morrón

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV011560` (COMAV)

Lugar de colecta:

Jaraíz de la Vera (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento largo fino

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:


8,0±0,7 centímetros

Peso del fruto:

83,8±14,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,4±0,5 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente o ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo morrón

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV011561` (COMAV)

Lugar de colecta:

Jaraíz de la Vera (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento de bola redondo

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Casi redondo

Longitud del fruto:

2,8±0,3 centímetros

Peso del fruto:

10,5±1,4 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,3±0,3 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente o ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, moderado

Observaciones::

Pimiento tipo bola

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV011564' (COMAV)

Lugar de colecta:

Casar de Palomero (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento rojo grueso

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:


10,8±0,7 centímetros

Peso del fruto:

116,0±33,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,1±0,5 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo lamuyo

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV011565` (COMAV)

Lugar de colecta:

Casar de Palomero (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento rojo grueso

Altura de la planta::

Media- alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

14,6±2,4 centímetros

Peso del fruto:

195,7±50,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,9±0,5 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo california

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV011569' (COMAV)

Lugar de colecta:

Villanueva de la Vera (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento cornicabreño

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

21,7±3,2 centímetros

Peso del fruto:

63,4±13,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,7±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo guinda muy grande

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV011573` (COMAV)

Lugar de colecta:

Abadía (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Cornicabra grande

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

10,9±1,2 centímetros

Peso del fruto:

164,9±43,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,4±0,3 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'BGV011574' (COMAV)

Lugar de colecta:

Jaraíz de la Vera (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento de bola alargado

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

6,0±0,8 centímetros

Peso del fruto:

36,7±3,8 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,4±0,5 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente o ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, moderado

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV011583` (COMAV)

Lugar de colecta:

Mas de las Matas (Teruel, ESP)

Nombre local:

Pimiento de asar

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

99 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

8,6±0,7 centímetros

Peso del fruto:

146,6±34,3 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,3±0,5 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Presente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo morrón

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`BGV013144` (COMAV)

Lugar de colecta:

Tenerife (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)

Nombre local:

Pimienta

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

9,1±2,3 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

143 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

7,6±0,4 centímetros

Peso del fruto:

15,5±1,3 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,6±0,2 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, fuerte

Observaciones::

Pimiento tipo guindilla

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`CA-6` (IMIDA)

Lugar de colecta:

Región de Murcia (Murcia, ESP)

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta:

Media (45-65 centímetros)

Longitud del tallo:

18,8±3,6 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

104 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

9,7±1,4 centímetros

Peso del fruto:

36,4±7,8 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,5±0,6 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones:

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`CA-8` (IMIDA)

Lugar de colecta:

Bullas (Murcia, ESP)

Nombre local:

Pimiento cuerno

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

22,6±3,8 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

104 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

20,7±2,1 centímetros

Peso del fruto:

74,7±11,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,6±0,2 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado o intermedio

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Sin evaluar

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`CA-12` (IMIDA)

Lugar de colecta:

Región de Murcia (Murcia, ESP)

Nombre local:

Morrón conserva

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

23,8±2,9 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

107 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:


8,3±0,6 centímetros

Peso del fruto:

112,1±18,1 gramos

Espesor de la pared del fruto:

6,0±0,5 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

No corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo morrón

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`CA-12-1` (IMIDA)

Lugar de colecta:

Zaén de Arriba (Murcia, ESP)

Nombre local:

Morrón de conserva

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Dentado o intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

19,0±1,7 centímetros

Peso del fruto:

40,9±10,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,3±0,7 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`CA-23` (IMIDA)

Lugar de colecta:

Región de Murcia (Murcia, ESP)

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta:

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

23,6±3,2 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

101 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:


17,1±1,6 centímetros

Peso del fruto:

40,6±7,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,5±0,4 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio o muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Sin evaluar

Observaciones:

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'Corera F1' (V. comercial)

Lugar de colecta:

Variedad comercial

Nombre local:

Pimiento morrón

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

23,8±2,5 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

107 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

9,3±0,7 centímetros

Peso del fruto:

133,0±23,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,9±0,8 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado o corrugado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

No corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo morrón

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`Infante` (V. comercial)

Lugar de colecta:

Variedad comercial

Nombre local:

Pimiento lamuyo

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

20,8±3,6 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

8,9±1,6 centímetros

Peso del fruto:

161,5±49,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,5±0,7 milímetros



IMAGEN DE CATÁLOGO
COMERCIAL

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo lamuyo

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`Jaranda´ (V. comercial)

Lugar de colecta:

Variedad comercial

Nombre local:

Guinda para pimentón dulce

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

23,6±2,1 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

125 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

14,8±1,3 centímetros

Peso del fruto:

20,0±3,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,0±0,3 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo guinda, selección de pimientos de La Vera. Muy cultivada

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`Jariza´ (V. comercial)

Lugar de colecta:

Variedad comercial

Nombre local:

Guinda para pimentón dulce

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

20,5±2,3 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

120 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

15,1±1,5 centímetros

Peso del fruto:

20,3±4,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,1±0,3 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

No corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo guinda, selección de pimientos de La Vera. Muy cultivada

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`Jeromín´ (La Orden)

Lugar de colecta:

Guadajira (Badajoz, ESP)

Nombre local:

Guinda para pimentón picante

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

21,6±2,7 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio o dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

142 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

4,3±0,5 centímetros

Peso del fruto:

18,0±2,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,4±0,4 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado o intermedio

Longitud de la placenta:

>1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente

Observaciones::

Selección picante de poblaciones locales de pimientos de La Vera

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`MU-CA-3' (COMAV)

Lugar de colecta:

San Javier (Murcia, ESP)

Nombre local:

Pimiento gallego

Altura de la planta:

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

33,2±1,8 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

9,5±0,8 centímetros

Peso del fruto:

31,7±7,4 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,8±1,0 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Sin evaluar

Observaciones:

Pimiento tipo padrón

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'MU-CA-7' (IMIDA)

Lugar de colecta:

Torre Pacheco (Murcia, ESP)

Nombre local:

Trompa de vaca

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

13,4±1,1 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

136 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

14,3±1,3 centímetros

Peso del fruto:

169,8±41,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,5±0,8 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado, cordado o truncado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo lamuyo

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`MU-CA-8' (IMIDA)

Lugar de colecta:

Torre Pacheco (Murcia, ESP)

Nombre local:

Pimiento morro de vaca

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

20,2±1,9 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

84 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

18,1±3,3 centímetros

Peso del fruto:

55,0±13,6 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,1±0,6 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo italiano de forma cónica, muy uniforme en forma y tamaño, dulce

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`MU-CA-10` (COMAV)

Lugar de colecta:

Región de Murcia (Murcia, ESP)

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

16 centímetros (planta representativa)

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

139

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:


23,2±1,4 centímetros

Peso del fruto:

33,1±6,5 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,8±0,1 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`MU-CA-17` (IMIDA)

Lugar de colecta:

Beniajan. Murcia (Murcia, ESP)

Nombre local:

Pimiento largo

Altura de la planta:

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

24,4±0,9 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

11,6±1,7 centímetros

Peso del fruto:

73,6±14,2 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,0±0,5 milímetros

IMAGEN NO DISPONIBLE

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Romo o hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones:

Se observan dos tipos de fruto muy diferentes

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`MU-CA-18-1` (IMIDA)

Lugar de colecta:

Región de Murcia (Murcia, ESP)

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Entero (liso)

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

18,5±1,3 centímetros

Peso del fruto:

244,5±30,9 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,7±0,7 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Cordado

Forma del ápice del fruto:

Romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado o intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, muy ligero

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`MU-CA-22` (IMIDA)

Lugar de colecta:

Los Pavos. Alhama de Murcia (Murcia, ESP)

Nombre local:

Pimiento morrón de conserva

Altura de la planta::

Media (46-65 centímetros)

Longitud del tallo:

21,6±2,7 centímetros

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausernte

Días a la fructificación:

142 días

Forma del fruto:

Casi redondo

Longitud del fruto:


7,5±1,5 centímetros

Peso del fruto:

86,2±26,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

6,8±1,2 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado o cordado

Forma del ápice del fruto:

Hundido o romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Leve, intermedio o muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo morrón

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`P012009` (La Orden)

Lugar de colecta:

Olivenza (Badajoz, ESP)

Nombre local:

Pimiento grande de Olivenza

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Entero (liso)

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la _ructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

16,4±1,1 centímetros

Peso del fruto:

286,4±66,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

5,8±0,6 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Muy corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 o 1/4 -1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo lamuyo, productivo, muy buena calidad gustativa

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`P012012' (La Orden)

Lugar de colecta:

Isla Gomera (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta::

Sin evaluar

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la fructificación:

150

Forma del fruto:

Triangular o elongado

Longitud del fruto:

11,4±1,0 centímetros

Peso del fruto:

42,0±5,3 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,4±0,6 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Lobulado o cordado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado o hundido y apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Sin observaciones

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`P022009` (La Orden)

Lugar de colecta:

Aldeanueva de la Vera (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento largo verato

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

31,6±2,0 centímetros

Peso del fruto:

34,5±6,0 gramos

Espesor de la pared del fruto:

1,8±0,1 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Obtuso

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio o muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 o >1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo guinda muy alargada

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`P032009' (La Orden)

Lugar de colecta:

Aldeanueva de la Vera (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Pimiento grueso verato

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

Sin evaluar

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

28,8±3,8 centímetros

Peso del fruto:

63,3±14,8 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,6±0,2 milímetros



Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado o cordado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado o romo

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio o muy corrugado

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Ausente

Observaciones::

Pimiento tipo guinda grande y carnosa

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

'PAS014702' (COMAV)

Lugar de colecta:

Valle del Jerte (Cáceres, ESP)

Nombre local:

Desconocido

Altura de la planta::

Alta (>85 centímetros)

Longitud del tallo:

Sin evaluar

Margen del cáliz:

Dentado

Constricción anular del cáliz:

Presente

Días a la fructificación:

90 días

Forma del fruto:

Elongado

Longitud del fruto:

25,4±2,8 centímetros

Peso del fruto:

52,6±9,3 gramos

Espesor de la pared del fruto:

2,3±0,2 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Prsente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo guinda

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (colección activa):

`Piquillo' (V. comercial)

Lugar de colecta:

Variedad comercial

Nombre local:

Pimiento del piquillo

Altura de la planta::

Media-alta (66-85 centímetros)

Longitud del tallo:

23,0±5,8 centímetros

Margen del cáliz:

Sin evaluar

Constricción anular del cáliz:

Sin evaluar

Días a la fructificación:

105 días

Forma del fruto:

Triangular

Longitud del fruto:

10,5±1,1 centímetros

Peso del fruto:

41,1±2,5 gramos

Espesor de la pared del fruto:

3,5±0,5 milímetros




IMAGEN DE CATÁLOGO
COMERCIAL

Forma del fruto en la unión con el pedicelo:

Truncado

Forma del ápice del fruto:

Apuntado

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Levemente corrugado

Longitud de la placenta:

<1/4 longitud del fruto

Sabor picante

Presente, ligero

Observaciones::

Pimiento tipo piquillo

Especie:

Capsicum annuum L.

Clave (_ructific activa):

`Plaza Bullas` (IMIDA)

Lugar de colecta:

Bullas (Murcia, ESP)

Nombre local:

Pimiento de plaza

Altura de la planta::

Media (46-65) centímetros

Longitud del tallo:

19,2±1,5 centímetros

Margen del cáliz:

Intermedio

Constricción anular del cáliz:

Ausente

Días a la _ructificación:

125 días

Forma del fruto:

Acampanulado y en bloque

Longitud del fruto:

8,6±1,3 centímetros

Peso del fruto:

126,5±14,7 gramos

Espesor de la pared del fruto:

4,0±0,7 milímetros

**Forma del fruto en la unión con el pedicelo:**

Lobulado

Forma del ápice del fruto:

Hundido

Apéndice en el fruto, vestigio de la floración:

Ausente

Arrugamiento transversal del fruto:

Intermedio

Longitud de la placenta:

1/4-1/2 longitud del fruto

Sabor picante

Sin evaluar

Observaciones::

Pimiento tipo lamuyo



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Invertimos en su futuro



Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria

GOBIERNO DE EXTREMADURA



CICYTEX